

Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren 2025

Meldungen der Bezirksforstbehörden für das Berichtsjahr 2025 (DWF 2025): Anzahl der Meldungen (N), Volumen geschädigter Bäume in Vorratsfestmeter (Vfm), reduzierte Fläche geschädigter Bäume in Hektar (ha) sowie die Entwicklung zum Vorjahr (stark abnehmend: Abnahme => 50 %; abnehmend: Abnahme 5-50 %; gleichbleibend: Veränderung zwischen -5 % und +5 %; zunehmend: Zunahme 5-50 %; stark zunehmend => 50 %; * kein Vergleich mit Vorjahr möglich).

Schädigungs- gruppen	Schädigungsfaktoren	wissenschaftlicher Name / englischer Bezeichnung	N	Vfm	ha	Entwicklung
Insekten an Holz/Rinde	Blauer Kiefernprachtkäfer	<i>Phaenops cyanea</i>	13	2.168	85	abnehmend
	Buchdrucker	<i>Ips typographus</i>	371	1.700.544	18.135	abnehmend
	Fichtenbock	<i>Tetropium fuscum, Tetropium castaneum</i>	36	2.824	44	gleichbleibend
	Großer brauner Rüsselkäfer	<i>Hylobius abietis</i>	160		1.338	gleichbleibend
	Großer Lärchenborkenkäfer	<i>Ips cembrae</i>	40	6.397	6.116	zunehmend
	Großer und Kleiner Waldgärtner	<i>Tomicus piniperda, Tomicus minor</i>	64	17.410	1.205	abnehmend
	Kiefernrüßler	<i>Pissodes pini, Pissodes piniphilus, Pissodes castaneus</i>	5	1.265	26	stark zunehmend
	Kleiner Buchdrucker	<i>Ips amitinus</i>	9	730	8	stark abnehmend
	Kupferstecher	<i>Pityogenes chalcographus</i>	263	160.243	4.980	abnehmend
	Lärchenbock	<i>Tetropium gabrieli</i>	19	3.489	211	abnehmend
	Riesenbastkäfer	<i>Dendroctonus micans</i>	10	803	15	abnehmend
	Sechszähniger- und Zwölfzähniger Kiefernborckenkäfer	<i>Ips acuminatus, Ips sexdentatus</i>	41	21.160	889	stark abnehmend
	Tannenborkenkäfer	<i>Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Pityokteines vorontzowi, Cryphalus piceae</i>	87	23.609	334	zunehmend
Nadelschädlinge	Fichtengespinstblattwespe	<i>Cephalcia abietis</i>	15		645	stark zunehmend
	Grauer Lärchenwickler	<i>Zeiraphera diniana</i>	6		132	stark abnehmend
	Kiefernbuschhornblattwespen	<i>Diprion pini, Gilpinia polytoma, Gilpinia socia, Neodiprion sertifer</i>	3		155	zunehmend
	Kleine Fichtenblattwespe	<i>Pristiphora abietina</i>	11		207	stark zunehmend
	Lärchenknospengallmücke	<i>Dasineura kellneri (syn. Dasineura laricis)</i>	2		63	stark abnehmend
	Lärchenminiermotte	<i>Coleophora laricella</i>	28		338	zunehmend
	Lärchennadelknicklaus	<i>Adelges geniculatus, Adelges laricis, Sacchiphantes viridis</i>	29		1.268	zunehmend
	Nonne	<i>Lymantria monacha</i>	2		85	stark zunehmend
	Pinienprozessionsspinner	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	1		60	gleichbleibend
	Tannenläuse	<i>Dreyfusia nordmannianae, Dreyfusia merkeri, Deyfusia piceae, Mindarus abietinus</i>	91		2.570	zunehmend
Blattschädlinge	Amerikanische Eichennetzwanze	<i>Corythucha arcuata</i>	36		19.723	abnehmend
	Blattkäfer	<i>Chrysomelidae</i>	16		47	zunehmend
	Buchenspringrüssler	<i>Rhynchaenus fagi</i>	3		23	stark zunehmend
	Eichenprozessionsspinner	<i>Thaumetopoea processionea</i>	5		60	stark abnehmend
	Frostspanner und Wickler an Laubholz	<i>z.B. Erannis defoliaria, Operopthera brumata, Operopthera fagata, Tortrix viridana, Archips spp.</i>	8		67	stark abnehmend
	Gespinstmotten	<i>Yponomeuta spp.</i>	14		113	stark abnehmend
	Grünrüssler	<i>Polydrusus spp., Phyllobius spp.</i>	3		0	stark abnehmend
	Maikäfer	<i>Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani</i>	21		90	stark abnehmend
	Schwammspinner	<i>Lymantria dispar</i>	5		7	stark zunehmend
Wirbeltiere	Bilche und Eichhörnchen	<i>Glis glis, Eliomys quercinus, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius; Sciurus vulgaris</i>	27		32	abnehmend
	Hasen und Kaninchen	<i>Lepus europaeus, Lepus timidus; Oryctolagus cuniculus</i>	74		1.023	abnehmend
	Mäuse	<i>Arvicolinae</i>	75		229	abnehmend
Pilze an Nadelholz	Fichtennadelpilze	<i>Lirula macrospora, Lophodermium piceae, Tiarosporella parca, Rhizosphaera spp.</i>	58		6.575	zunehmend
	Fichtennadelrost	<i>Chrysomyxa rhododendri, Chrysomyxa abietis</i>	53		7.218	abnehmend
	Fichtentriebsterben	<i>Sirococcus conigenus, Pucciniastrum areolatum</i>	9		5	stark abnehmend
	Hallimasch in Nadelholzbeständen	<i>Armillaria spp. (Armillaria borealis, A. gallica, A. cepistipes, A. mellea, A. ostoyae)</i>	113	137.552	5.722	zunehmend
	Kiefernrrindenblasenrost/Kienzopf; Kiefernrrindendrehrost	<i>Cronartium flaccidum, Peridermium pini (syn. Endocronartium pini); Melampsora pinitorqua</i>	14		149	abnehmend
	Kiefernrschütte	<i>Dothistroma spp., Lecanosticta acicola, Cyclaneusma minus, Lophodermium seditiosum</i>	18		3.336	stark zunehmend
	Kiefernrtriebsterben	<i>Diplodia sapinea (syn. Sphaeropsis sapinea), Cenangium ferruginosum</i>	32		4.589	abnehmend

Schädigungs- gruppen	Schädigungsfaktoren	wissenschaftlicher Name / englischer Bezeichnung	N	Vfm	ha	Entwicklung
Pilze an Nadelholz	Lärchenkrebs	<i>Lachnellula willkommii</i>	22		36	abnehmend
	Lärchenschütten	<i>Mycosphaerella laricina</i> , <i>Hypodermella laricis</i> , <i>Meria laricis</i>	9		782	gleichbleibend
	Lärchentriebsterben	<i>Gremmeniella laricina</i>	1		100	stark zunehmend
	Phomopsis-Krankheit der Douglasie	<i>Allantophomopsiella pseudotsugae</i> (syn. <i>Phacidium coniferarum</i> , <i>Phomopsis pseudotsugae</i>)	0		0	stark abnehmend
	Rostige und Rußige Douglasienschütte	<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i> , <i>Rhabdocline pseudotsugae</i>	16		48	gleichbleibend
	Schneeschnitzpilz	<i>Phacidium infestans</i> , <i>Herpotrichia juniperi</i> (syn. <i>Herpotrichia nigra</i>), <i>Rosellina mycophila</i>	24		69	abnehmend
	Scleroderris-Krankheit	<i>Gremmeniella abietina</i>	6		32	stark zunehmend
Pilze an Laubholz	Edelkastanienrindenkrebs	<i>Cryphonectria parasitica</i>	26		287	abnehmend
	Eichenmehltau	<i>Erysiphe alphitoides</i>	43		254	stark abnehmend
	Eschenkrebs	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>fraxini</i>	46		96	stark abnehmend
	Eschentriebsterben	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	225		31.402	gleichbleibend
	Hallimasch in Laubholzbeständen	<i>Armillaria</i> spp. (<i>Armillaria borealis</i> , <i>A. gallica</i> , <i>A. cepistipes</i> , <i>A. mellea</i> , <i>A. ostoyae</i>)	38	14.435	649	zunehmend
	Rußrindenkrankheit	<i>Cryptostroma corticale</i>	10	749	33	stark abnehmend
	Ulmensterben	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	50	3.648	216	abnehmend
	Wurzelhalsfäule der Erle	<i>Phytophthora alni</i> ssp. <i>alni</i> , <i>Phytophthora alni</i> ssp. <i>multiformis</i> , <i>Phytophthora alni</i> ssp. <i>uniformis</i>	22		48	abnehmend
Abiotische Schädigungen	Dürre- und Hitzeschäden	Drought- and Heat damage	93		1.718	stark abnehmend
	Frostschäden	Frost damage	54		512	stark abnehmend
	Hagelschlag	Hail damage	26		3.267	stark zunehmend
	Lawinen	Avalanches	7	1.270	6	stark abnehmend
	Muren	Torrents	27	3.978	23	stark abnehmend
	Schneebruch, Eisanhang und Raureif	Damage by snow and ice	114	172.597	2.161	stark abnehmend
	Waldbrand	Forest fire	28	2.392	22	zunehmend
	Windwurf, -bruch	Windthrow and windbreak	300	678.725	12.149	stark abnehmend
Komplex-/ sonstige Schäden	Buchen-Zurücksterben	Beech decline	35		808	stark zunehmend
	Eichen-Zurücksterben	Oak decline	24		1.920	abnehmend
	Misteln an Nadel- und Laubholz	<i>Viscum album</i> , <i>Loranthus europaeus</i>	116		2.770	gleichbleibend