

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2691 / 0 GHS09	<b>Flexidor</b> Dow AgroSciences GmbH	<b>Isoxaben</b> 500 g/l	0,1 ml/m <sup>2</sup> bei 30-60 ml/m <sup>2</sup> ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 1 N, GHS09	<b>Star Isoxaben</b> Star Agro Analyse und Handels GmbH	<b>Isoxaben</b> 500 g/l	0,1 ml/m <sup>2</sup> bei 30-60 ml/m <sup>2</sup> ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 2 N, GHS09	<b>Agro Isoxaben</b> Zorn GmbH.	<b>Isoxaben</b> 500 g/l	0,1 ml/m <sup>2</sup> bei 30-60 ml/m <sup>2</sup> ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 3 N, GHS091	<b>Rodixelf</b> Fattinger GmbH.	<b>Isoxaben</b> 500 g/l	0,1 ml/m <sup>2</sup> bei 30-60 ml/m <sup>2</sup> ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2744 / 0 N, Xn	<b>Select 240 EC</b> Arysta LifeScience	<b>Clethodim</b> 241,9 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2790 / 0	<b>Fuslade MAX</b> Nufarm GmbH.	<b>Fluazifop-P</b> 107 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter
2790 / 1	<b>Fusilade MAX</b> Star Agro Analyse und Handels GmbH	<b>Fluazifop-P</b> 107 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2809 / 0 ---	<b>Touchdown Quattro</b> Syngenta Agro GmbH	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Glyphosate Ammonium- Salz</b> 435 g/l	3-5 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen: während Vegetationsperiode (vor Beetbearbeitung oder Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) oder Herbst (nach Abschluss Kulturwachstum oder ohne Jungwuchs)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2912 / 0 GHS07, GHS08, GHS09	<b>Laudis</b> Bayer Austria GmbH	<b>Tembotrione</b> 44 g/l <b>Isoxadifen-ethyl (Safener)</b> 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2912 / 3 GHS07, GHS08, GHS09	<b>Laudis</b> Star Agro Analyse und Handels GmbH	<b>Tembotrione</b> 44 g/l <b>Isoxadifen-ethyl (Safener)</b> 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2912 / 5 GHS07, GHS08, GHS09	<b>Laudis OD 66</b> Star Agro Handels GmbH	<b>Tembotrione</b> 44 g/l <b>Isoxadifen-ethyl (Safener)</b> 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2912 / 6 GHS07, GHS08, GHS09	<b>Laudis</b> Star Agro Handels GmbH.	<b>Tembotrione</b> 44 g/l <b>Isoxadifen-ethyl</b> <b>(Safener)</b> 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2928 / 0	<b>AGIL - S</b> ADAMA Deutschland GmbH	<b>Propaquizafop</b> 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras,
2928 / 1	<b>Agil 100 EC</b> Star Agro Handels GmbH.	<b>Propaquizafop</b> 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras,
2928 / 901	<b>Zetrola</b> ADAMA Deutschland GmbH.	<b>Propaquizafop</b> 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras
2948 / 0 ---	<b>Boom efekt</b> Albaugh TKI d.o.o.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha;  15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2948 / 1 ---	<b>Boom Effekt</b> Star Agro Handels G,bH	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	4 l/ha 200-400 l/ha;  15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag
2948 / 2 ---	<b>Boom effekt 360 SL</b> Star Agro Handels G,bH	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	4 l/ha 400-600 l/ha;  15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag
2948 / 901 ---	<b>Landmaster 360 TF</b> Albaugh TKI d.o.o.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha;  15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2948 / 902 ---	<b>Glyphox 360 TF</b> Albaugh TKI d.o.o.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha;  15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag
2948 / 903 ---	<b>Rosate Clean 360</b> Albaugh TKI d.o.o.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha;  15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze;  Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter;  Stockausschlag
3106 / 0 N	<b>Chikara</b> ISK Biosciences Europe N. V.	<b>Flazasulfuron</b> 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3106 / 2	<b>Terafit</b> Star Agro Handels GmbH	<b>Flazasulfuron</b> 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 3	<b>Flazoflex</b> Zorn GmbH	<b>Flazasulfuron</b> 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 4	<b>Katana</b> Fattinger GmbH	<b>Flazasulfuron</b> 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 901 N	<b>Katana</b> ISK Biosciences Europe N.V.	<b>Flazasulfuron</b> 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen

## Herbizide

















Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3540 / 0 GHS08, GHS09	<b>Laudis WG</b> Bayer Austria GmbH	<b>Tembotrione</b> 200 g/kg <b>Isoxadifen-ethyl</b> <b>(Safener)</b> 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3540 / 1 GHS08, GHS09	<b>Laudis WG</b> Star Agro Analyse und Handels GmbH	<b>Tembotrione</b> 200 g/kg <b>Isoxadifen-ethyl</b> <b>(Safener)</b> 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3599 / 0 N, GHS09	<b>Nasa</b> Agria S.A.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin-Salz</b> 485,8 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha  4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs, Mai-Juni bzw. September-November (Zwischenreihen);  Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs, August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
3630 / 0 ---	<b>Gallup Biograde 360</b> Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3630 / 1	<b>Vidia</b> Star Agro Handels GmbH.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs,	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3630 / 901 ---	<b>Barbarian Super 360</b> Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 485,8 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3631 / 0 ---	<b>Glypho-Rapid 450</b> Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	<b>Glyphosate</b> 450 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 607,5 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3692 / 0 GHS09	<b>Shyfo</b> Sharda Europe b.v.b.a.	<b>Glyphosate</b> 360 g/l <b>Isopropylamin- Salz</b> 478,2 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha  4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs Mai-Juni bzw. September-November (Zwischenreihen);  Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs: August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
4257 / 0	<b>Clethofin 240</b> Finchimca S.p.A.	<b>Clethofin 240</b> 240 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4376 / 0	<b>Arrodim</b> ADAMA Deutschland GmbH.	<b>Clethodim</b> 240 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,

## Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
4467 / 0	<b>Clinic Xtreme</b> Nufarm GmbH.	<b>Glyphosat</b> 540 g/l	5,33 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter,
4467 / 1	<b>Credit Xtreme</b> Star Agro Handels GmbH	<b>Glyphosat</b> 540 g/l	5,33 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
4469 / 0	<b>Fusilade Forte</b> Nufarm GmbH.	<b>Fluazifob-P</b> 128 g/l	1 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4469 / 1	<b>Flua Power</b> Star Agro Handels GmbH	<b>Fluazifob-P</b> 128 g/l	1 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4471 / 0	<b>Roundup Future</b> Monsanto Agrar Deutschland GmbH.	<b>Glyphosat</b> 500 g/l	1,44 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen während der Vegetationsperiode als Teilflächenbehandlung mit Abschirmvorrichtung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4473 / 0	<b>Glister Ultra</b> Sinon EU GmbH.	<b>Glyphosat</b> 360 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter,

GHS-System, Gefahrenklassen		Bisheriges System, Gefahrensymbole	
GHS02		F F+	 leichtentzündlich  hochentzündlich
GHS03		O	 brandfördernd
GHS05		C	 ätzend
GHS06		T T+	 giftig  sehr giftig
GHS07		Xi	 reizend
GHS08		Xn	 gesundheitsschädlich
GHS09		N	 umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny  
 Tel. +43-(0)1-87838-1103  
 E-Mail: [bernhard.perny@bfw.gv.at](mailto:bernhard.perny@bfw.gv.at)

Ing. Eiko Gatterbauer  
 Tel. +43-(0)1-87838-1101  
 E-Mail: [eiko.gatterbauer@bfw.gv.at](mailto:eiko.gatterbauer@bfw.gv.at)