

Insektizide gegen sonstige schädliche Insekten (Borken- und Rüsselkäfer in gesonderter Liste)

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2519 / 0	Nematon Biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktion s-, Handels- und Beratungs-GmbH.	Entomopathogene Nematoden (Heterorhabditis bacteriophora)	500.000 Nematoden pro m ²	Gießen	Gartenlaubkäfer
2730 / 0 ---	Nematop E-Nema GmbH	Entomopathogene Nematoden (Heterorhabditis bacteriophora)	500.000 Nematoden pro m ² 0,2-1 l/m ²	Gießen, spritzen; Bei Befall (Mitte Juli bis Ende September)	Dickmaulrüssler
3061 / 0 GHS07, GHS08, GHS09	Karate Zeon Syngenta Agro GmbH.	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	0,075 l/ha 300 l/ha	Spritzen oder sprühen, nach bzw. bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden der ersten Symptome (Frühjahr bis Herbst), bei Jungwuchs	freifressende Schmetterlingsraupen bzw. Blattläuse, blatt-/ nadelfressende Käfer (ausgen. Maikäfer)
3061 / 1 GHS07, GHS08, GHS09	Karate avec Technologie Zeon Syngenta Agro GmbH.	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	0,075 l/ha 300 l/ha	Spritzen oder sprühen, nach bzw. bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden der ersten Symptome (Frühjahr bis Herbst), bei Jungwuchs	freifressende Schmetterlingsraupen bzw. Blattläuse, blatt-/ nadelfressende Käfer (ausgen. Maikäfer)
3061 / 2 GHS07, GHS08, GHS09	Karate Zeon Fattinger GmbH.	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	0,075 l/ha 300 l/ha	Spritzen oder sprühen, nach bzw. bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden der ersten Symptome (Frühjahr bis Herbst), bei Jungwuchs	freifressende Schmetterlingsraupen bzw. Blattläuse, blatt-/ nadelfressende Käfer (ausgen. Maikäfer)

Insektizide gegen sonstige schädliche Insekten (Borken- und Rüsselkäfer in gesonderter Liste)

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3061 / 901 GHS07, GHS08, GHS09	Karate Zeon Forst Syngenta Agro GmbH.	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	0,075 l/ha 300 l/ha	Spritzen oder sprühen, nach bzw. bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden der ersten Symptome (Frühjahr bis Herbst), bei Jungwuchs	freifressende Schmetterlingsraupen bzw. Blattläuse, blatt-/ nadelfressende Käfer (ausgen. Maikäfer)
4249 / 0	Engerling - Stopp biohelp Garten & Bienen	Entomopathogene Nematoden (Heterorhabditis bacteriophora)	500.000 Nematoden pro m ²	Gießen oder spritzen; nach Bedarf	Gartenlaubkäfer, Gefurchter Dickmaulrüssler, Weiden-Dickmaulrüssler
4620 / 0	Mycetel Koppert B.V.	Lecanicillium muscarium (Stamm Ve6 48 g/ha)	2 kg/ha Wasser 1000 – 2000 l/ha	Sprühen oder spritzen; Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen	Weißer Fliege, (Mattenschildlaus)

GHS-System, Gefahrenklassen		Bisheriges System, Gefahrensymbole	
GHS02		F	leichtentzündlich
		F+	hochentzündlich
GHS03		O	brandfördernd

GHS05		C		ätzend
GHS06		T		giftig
GHS07		T+		sehr giftig
GHS08		Xi		reizend
GHS09		Xn		gesundheitsschädlich
		N		umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny
 Tel. +43-(0)1-87838-1103
 E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer
 Tel. +43-(0)1-87838-1101
 E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at